

ALICUPRIN®

HNOJIVO ES

Hnojivo na báze medi v suspenzii

Zloženie: celková meď (Cu) 377,5 g.t⁻¹, 25 % hmot.**ROZSAH A SPÔSOB POUŽITIA**

ALICUPRIN® je tekuté koncentrované meďnaté hnojivo formulované ako suspenzný koncentrát a je určené pre použitie v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve. Meď priaznivo pôsobí na stabilitu chlorofylu, ktorý je potom neskôr odbúravajú, takže sa predlžuje obdobie aktívnej fotosyntézy. Pri nedostatku medi sa výrazne znižuje využitie dusíka z hnojív, pri obilninách sa tvorí menej zrna ako dôsledok narušenia tvorby generatívnych orgánov. Nedostatok medi sa prejavuje najmä na ľahkých a kyslých pôdach, na kyslých pôdach po radikálnom vápnení alebo na pôdach s vyšším obsahom organickej hmoty (po zaoraní pozberových zvyškov).

Alicuprin aplikujte do pôdy pred sejbou alebo postrekom na list v nižšie uvedených dávkach a termínoch podľa jednotlivých plodín.

ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU

| PLODINA | DÁVKA l.ha ⁻¹ | APLIKÁCIA |
|-------------------------|------------------------------|--|
| OBILNINY ozimné a jarné | 0,2 - 0,5 l.ha ⁻¹ | počas vegetácie, max. do 4 týždňov pred zberom, 100 - 400 l vody / ha |
| REPKA | 0,4 - 2,1 l.ha ⁻¹ | počas vegetácie, max. do 4 týždňov pred zberom, min 200 l vody / ha |
| CUKROVÁ REPA | 1,6 - 2,6 l.ha ⁻¹ | počas vegetácie až do doby posledného fungicidného postreku, min. 200 l vody / ha |
| KUKURICA | 0,7 - 1,4 l.ha ⁻¹ | počas vegetácie, max. do 4 týždňov pred zberom, min 200 l vody / ha |
| STRUKOVINY | 0,7 - 1,4 l.ha ⁻¹ | počas vegetácie, max. do 4 týždňov pred zberom, min 200 l vody / ha |
| CHMEL | 3,6 - 5,2 l.ha ⁻¹ | počas celej vegetácie 500 -2000 l vody / ha |
| JADROVINY, KÔSTKOVINY | 0,7 - 3,1 l.ha ⁻¹ | počas vegetácie, max. do 4 týždňov pred zberom, min. 300 - 1000 l vody / ha |
| MAK | 1 - 2,2 l.ha ⁻¹ | počas vegetácie, max. do 4 týždňov pred zberom, min 200 l vody / ha |
| VINIČ | 2,1 - 4,2 l.ha ⁻¹ | od fázy pučania (zazelenanie) až do fázy ukončenia tvorby strapcov, min 300-1000 l vody / ha |
| ZELENINA | 4,2 l.ha ⁻¹ | počas celej vegetácie, 300-400 l vody / ha |

Uvedené dávky vyjadrujú celkovú potrebu medi a sú orientačné. Spresnenie dávok medi ku konkrétnym plodinám a ich prípadné delenie odporúčame na základe rozborov pôdy, popr. podľa výživného stavu rastlín.

Maximálna aplikačná dávka 4 kg Cu / ha / rok na rovnakom pozemku nesmie byť prekročená ani pri použití iných prípravkov a hnojív na báze medi.

Alicuprin je miešateľný so všetkými herbicidmi, fungicidmi a insekticidmi po konzultácii s ich výrobcami. Alicuprin je možné tiež miešať s listovými hnojivami alebo s kvapalným hnojivom DAM 390 po konzultácii s ich výrobcami.

SKLADOVANIE

Uchovávať v pôvodnom obale, tesne uzavreté, na bezpečnom mieste mimo dosahu detí, zvierat a potravín. Chrániť pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Skladujte v suchých a vetrateľných skladoch pri teplotách od + 5 °C do + 30 °C.

PRÍPRAVA APLIKAČNEJ KVAPALINY

1. Nádž postrekovača naplňte vodou do polovice až dvoch tretín požadovaného množstva a zapnite miešacie zariadenie.
2. Pridajte potrebné množstvo tohto produktu, a potom pridajte zvyšok vody. Miešacie zariadenie nechajte zapnuté. Pri kombinácii s ďalšími zložkami v tank-mix, tento produkt pridávajte vždy ako posledný (najmä po práškových produktoch). Nenechajte zmes stáť bez zapnutého miešacieho zariadenia.
3. Po postreku, vyčistite a opláchnite postrekovacie zariadenie.

Balenia: 5 l HDPE kanister;

Čistá hmotnosť: 7,5 kg