

Bora

KATEGORIE FUNKCE PRODUKTU

JEDNOSLOŽKOVÉ ANORGANICKÉ HNOJIVO SE STOPOVÝMI ŽIVINAMI KVV 1(C) (II) (a)

Typologie: Hnojivo s mikroživinami v roztoku

DEKLAROVANÝ OBSAH ŽIVIN PODLE HMOTNOSTI:

Bór (B) jako kyselina boritá

11,0% - 150 g/l

Kobalt (Co) jako síran kobaltnatý - 0,0002%; Molybden (Mo) jako amonná sůl - 0,5%.

VLASTNOSTI

Kapalně koncentrované bor-molybden-kobaltové (**B-Mo-Co**) hnojivo je koncipováno hlavně pro luštěniny. Rostliny vyžadují bór po celou vegetační dobu. Bór stimuluje tvorbu generativních částí rostliny a také růst semen a plodů. Stimuluje vývoj kořenového systému, zvyšuje odolnost vůči houbovým chorobám a suchu. Molybden podporuje proces fixace dusíku v kořenech luštěnin. Kobalt je zásadním faktorem pro růst a fixaci dusíku u luštěnin.

SLOŽENÍ:

kyselina boritá, č. CAS: 10043-35-3 (CMC1); Monoethanolamin, č. CAS: 141-43-5 (CMC1).

NÁVOD K POUŽITÍ:

PLODINY	DÁVKOVÁNÍ	ZPŮSOB A DOBA APLIKACE
Obilniny	0,5-1,0 l/ha	Aplikace na list: I-BBCH 21-30; II-BBCH 30-95
Olejniny		Aplikace na list: I-BBCH 10-15; II-BBCH 61-71
Luštěniny		Aplikace na list: I-3-5 listů; II-počátek butonizace
Řepa		Listová aplikace při tvorbě 50 % listů
Kukuřice		Aplikace na list: I-2-4 listy; II-4-6 listů
Brambor	0,25-0,5 l/100 l vody	Listová aplikace: I-vývoj listů a stonků, II-tvorba hlíz, III-kvetení, IV-zrání
Zelenina	0,25-0,5 l/100 l vody / záливka 0,2-0,5% roztok*	Listová aplikace/záливka během butonizace, začátku kvetení nebo tvorby hlíz (plodů), 3-5krát
Ovocné výsadby		
Réva vinná		
Okrasné rostliny		

*Roztok 0,2-0,5% (200-500 ml / 100 l vody)

Používejte pouze v případě, že je to potřeba. Nepřekračujte aplikační dávku. Pouze pro profesionální použití. Před použitím protřepejte. Nedoporučuje se používat při teplotách nad 25 °C nebo pod 10°C. Pro konkrétní doporučení kontaktujte společnost Ikar Agro Solutions s.r.o.

KOMPATIBILITA

Bora může být použita ve směsích s mnoha hnojivy a pesticidy (insekticidy, fungicidy). Nepoužívejte s produkty obsahujícími vysoké množství mědi (Cu), síry (S), minerálních olejů a s alkalickými produkty (pH > 8). Před aplikací se doporučuje rozmíchat malé množství směsi, aby se zkontrolovalo, zda v ní není sediment. Doporučuje se nastříkat na malou plochu, aby se zkontrolovalo, zda nedochází k fytotoxickým účinkům na rostliny.

DOPORUČENÉ PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ

Chraňte před přímým slunečním zářením a možným mechanickým poškozením obalu. Skladujte mimo dosah dětí. Výrobek skladujte při teplotách od +5 °C do +35 °C.

INFORMACE O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Po dokončení práce s produktem si pečlivě umyjte ruce mýdlem.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.

- Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata.
- Zabraňte kontaktu výrobku s pokožkou nebo očima.
- Při kontaktu s pokožkou si místo okamžitě omyjte mýdlem a vodou.

STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI

Žádné

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ

P262 Zabraňte styku s očima, kůží a oděvem

P264 Po manipulaci si důkladně umyjte ruce

DALŠÍ INFORMACE



POLYSACHARIDY

2,0% - 28 g/l

DATUM VÝROBY JE uvedeno na obalu.

TRVANLIVOST PRODUKTU při správném skladování je 3 roky od data výroby.

ČÍSLO ŠARŽE uvedeno na obalu.

NETTO OBJEM 5 l ± 1 %

DODAVATEL / DOVOZCE / DISTRIBUTOR

VÝROBCE

Ikarai, UAB

Vakarų str. 6, Kedainiai, Lithuania

www.ikarfactory.eu, info@ikarfactory.eu

DISTRIBUTOR

IKAR Agro Solutions s.r.o.

Pod Havránkou 7/6a

171 00 Praha 7 – Trója

www.ikaragro.cz

