

HUMEKS

rostlinný biostimulant

Žadatel: Dolina-Agro Czech Republik s.r.o., V zářezu 902/4, Jinonice, 15800 Praha 5, Tel.: +420 792 315 302

Výrobce: MČ VVP Dolina, Evropska 146A/406, Poltava, 36008, Ukrajina

Číslo rozhodnutí o registraci: 5696

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vlastnost:	Hodnota:
Humínové látky v % min.	20,0
pH	7,0 – 9,0

Obsah rizikových prvků splňuje limity platné v ČR.

Humeks je rostlinný biostimulant, který je určený k ošetření osiva a k listové aplikaci v průběhu vegetace. Obsahuje humínové látky z LEONARDITU.

Humeks podporuje růst rostlin, rozvoj kořenového systému a nárůst zelené hmoty rostlin, zvyšuje kvalitu sklizeného produktu.

ROZSAH A ZPŮSOB POUŽITÍ:

Plodina	Termín aplikace (BBCH)	Dávkování
Obilniny	Odnožování (21-25)	0,1 l/ ha
	Jarní odnožování (25-29)	0,1 l/ ha
	Praporcový list (39-45)	0,1 l/ ha
Kukuřice	3-5 listů (13-15)	0,1 l/ ha
	7-8 listů (17-18)	0,1 l/ ha
Luskoviny	3-5 listů (trojčetných) (13-15)	0,1l/ ha
	Butonizace (55-59)	0,1l/ha
Řepka	4-6 listů (14-16)	0,1 l/ ha
	Prodlužovací fáze (31-35)	0,1 l/ ha
	Butonizace (55-59)	0,1 l/ ha
Slunečnice	2-4 pár listů (14-18)	0,1 l/ ha
	6-8 pár listů (31-51)	0,1 l/ ha
Brambory	Plné klíčky (14-15)	0,1 l/ ha
	Butonizace (55-59)	0,1 l/ ha
	Po kvetení (70-73)	0,1 l/ ha
Réva vinná	Před kvetením (57)	0,1-0,2 l/ ha
	Po kvetení (71)	0,1-0,2 l/ ha
Cukrová řepa	4-6 listů (14-16)	0,1 l/ ha
	Spojování listů do řad (31-33)	0,1 l/ ha
	Spojování listů mezi řady (38-39)	0,1 l/ ha
Ovocné stromy	Před kvetením (57-59)	0,1-0,2 l/ ha
	Po kvetení (71)	0,1-0,2 l/ ha
Rajčata, paprika, lilek	3-5 listů (13-15)	0,1 l/ ha
	Butonizace (51-53)	0,1 l/ ha
Cibule, česnek	3-5 listů (13-15)	0,1 l/ ha
	Aktivní růst (41-43)	0,1 l/ ha
Mák	Od 6. listu (16-39)	0,1 l/ ha
	Butonizace (55-59)	0,1 l/ ha
	Po kvetení (71-75)	0,1 l/ ha

Okurky, melouny	3-5 listů (13-15)	0,1 l/ ha
	Aktivní růst (51-53)	0,1 l/ ha
Zelí	Aktivní růst (17-19)	0,1 l/ ha
	Formování hlávky (41-43)	0,1 l/ ha
Mrkev	3-5 listů (13-15)	0,1 l/ ha
	Spojování listů do řad (19-41)	0,1 l/ ha
Jahody	Před kvetením (57-59)	0,1 l/ ha
	Po kvetení (71-73)	0,1 l/ ha

KOMPATIBILITA S JINÝMI PŘÍPRAVKY:

Výrobek lze použít společně s biologickými přípravky, mořidly, běžnými přípravky na ochranu rostlin, regulátory růstu a listovými hnojivy.

PŘÍPRAVA PRACOVNÍHO ROZTOKU:

Před použitím je třeba důkladně protřepat kanystr s biostimulantem. Roztok připravujte v den použití.

Dávkování pro postřik: 0,1 l/ha (70–400 l/ha pracovního roztoku); 0,1-0,2 l/ha (800–1000 l/ha pracovního roztoku).

V případě potřeby lze aplikovat až třikrát během vegetačního období.

Preventivní opatření: Výrobek uchovávejte v původním uzavřeném obalu a mimo dosah dětí.

První lékařská pomoc: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou. Při zasažení kůže odložte kontaminovaný oděv, zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. V případě zdravotních potíží se obraťte na lékaře.

Opatření a prostředky pro zneškodnění zbytků přípravků a zničení balení: balení a zbytky výrobku nevyžadují zvláštní metody ničení a zneškodnění.

Informace pro spotřebitele: postupujte podle pokynů pro použití, aby se zabránilo riziku pro člověka a životní prostředí.

Podmínky skladování:

Skladujte v chladném a suchém skladu, při teplotě do +30°C. Výrobek při zmrznutí neztrácí své vlastnosti. V případě zmrznutí je třeba umístit kanystr do teplé vody nebo na teplé místo až do doby, kdy výrobek opět přejde do kapalného stavu.

Klasifikace podle SZO, toxicita - 4 třída, netoxické.

Výrobek se dodává balený. Objem balení:

Doba použitelnosti: 5 let od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Datum výroby a číslo výrobní šarže: