



Elais

KATEGORIE FUNKCE PRODUKTU

KOMBINOVANÉ TEKUTÉ ANORGANICKÉ HNOJIVO S MAKROŽIVINAMI PFC 1 (C) (I) (b) (ii)

DEKLAROVANÝ OBSAH ŽIVIN PODLE HMOTNOSTI:

CELKOVÝ DUSÍK (N)	15,0 % – 200 g/l
Amoniakální dusík (N-NH₄)	10,0 % – 130 g/l
Amidický dusík (N-NH₂)	5,0 % – 70 g/l
OXID SÍROVÝ (SO₃) (= 22 % S), rozpustný ve vodě	55 % – 730 g/l
Molybden (Mo) ve formě amonné soli	0,4 % – 5 g/l

VLASTNOSTI

Dusíkato-sírné hnojivo obohacené o molybden. Síra podporuje fotosyntézu, tvorbu chlorofylu, dýchání, metabolismus dusíku a uhlíku, tvorbu mnoha vitamínů, enzymů a esenciálních olejů. Dusík podporuje a reguluje spoustu růstových a vývojových procesů a je součástí složení bílkovin, nukleových kyselin a enzymů. Molybden se podílí na metabolismu sloučenin dusíku a fosforu a zajišťuje účinnost těchto procesů. V době intenzivního růstu rostliny se síra využívá ke zvýšenému vstřebávání živin. V důsledku účinné aktivity v oblasti kořenů využívají rostliny s dostatkem síry efektivněji dusík v půdě. Interakce mezi dusíkem, sírou a molybdenem má za následek nerušený růst rostliny, včasný vývoj, úrodu a její kvalitu, zvýšenou účinnost dusíkatého hnojiva a vstřebávání dalších živin, které se účastní procesu růstu.

SLOŽENÍ:

Thiosíran amonný, č. CAS: 7783-18-8 (CMC1).

NÁVOD K POUŽITÍ:

Plodiny	Dávkování	Způsob a doba aplikace
Obiloviny	2,0 – 3,0 l/ha	Aplikace na list – postřik na listy, během intenzivního růstu. Podle fáze růstu – aplikujte 1–4krát.
Olejniny		
Luštěniny		
Řepa		
Kukuřice		
Brambory	0,25–0,5 l/100 l vody	Aplikace na list – postřik na listy, během intenzivního růstu.
Zelenina	0,25–0,5 l/100 l vody / zalévání 0,2–0,5% roztokem	Aplikace na list – postřik na listy, během intenzivního růstu. Podle fáze růstu – aplikujte 1–2krát.
Bobulovité keře		
Zahradní rostliny		
Okrasné rostliny		

Používejte pouze v případech, kdy je to skutečně zapotřebí. Nepřekračujte aplikační dávku. Pouze pro profesionální použití. Před použitím protřepte. Nedoporučuje se používat při teplotách vyšších než 25 °C nebo nižších než 10 °C.

Pro další konkrétní doporučení kontaktujte společnost UAB „Ikarai“ nebo společnost „ŽIVA zemědělská obchodní, a.s.“.

KOMPATIBILITA

Elais lze používat v kombinaci s mnoha hnojivy a pesticidy (insekticidy, fungicidy). Nepoužívejte v kombinaci s produkty s vysokým obsahem mědi (Cu), síry (S) a minerálních olejů. Před namícháním se doporučuje

smíchat malé množství směsi a zkontrolovat, zda v něm nejsou usazeniny. Doporučuje se nejdříve postříkat malou oblast, abyste zjistili, zda to nemá na rostliny fytotoxické účinky.

DOPORUČENÉ PODMÍNKY PRO SKLADOVÁNÍ

Uchovávejte mimo dosah přímého slunečního záření a možného mechanického poškození balení. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte produkt v teplotách nepřesahujících +35 °C a ne nižších než +5 °C.

INFORMACE K OCHRANĚ BEZPEČNOSTI A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Po dokončení práce s produktem si důkladně umyjte ruce mýdlem.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.
- Uchovávejte v bezpečné vzdálenosti od jídla, pití a krmení pro zvířata.
- Zabraňte styku produktu s pokožkou nebo očima.
- Jestliže dojde ke styku produktu s pokožkou, okamžitě ji umyjte mýdlem a vodou.

VĚTY O NEBEZPEČNOSTI

Žádné

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ

P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem

P264 Po použití si důkladně omyjte ruce

DALŠÍ INFORMACE



DATUM VÝROBY vyznačeno na balení.

TRVANLIVOST PRODUKTU při správném skladování je životnost produktu 3 roky od data výroby.

ČÍSLO ŠARŽE vyznačeno na balení.

NETTO OBJEM 5 l ± 1 %

DODAVATEL / DOVOZCE / DISTRIBUTOR

VÝROBCE

UAB „Ikarai“

Vakarų str. 6, Kedainiai, Litva

www.ikarfactory.eu, info@ikarfactory.eu

DISTRIBUTOR

ŽIVA zemědělská obchodní, a. s.

561 82 Klášterec nad Orlicí 120

www.ziva.cz, ziva@ziva.cz