

KINSIDRO GROW+

organominerální rostlinný biostimulant s mikroživinami a fulvokyselinami

Výrobce: Pro Farm OÜ, Keevise 10, 11415 Tallinn, Estonsko
info@profarm.org

Distributor: Corteva Agriscience Czech s.r.o., Pekařská 628/14 Jinonice (Praha 5), 155 00 Praha

Evidenční číslo vzájemného uznání: V947

Výrobek obsahuje komplex fulvokyselin na bázi ligninu doplněné o mikroživiny pro použití v obilninách, olejninách, luskovinách, pícech a rýži.

Aplikuje se na aktivně rostoucí rostliny. Zlepšuje kvalitativní vlastnosti rostlin tím, že optimalizuje aktivitu fotosystému a obsah chlorofylu a podporuje vývoj kořenů a výhonků. Tím zvyšuje výnos.

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Draslík jako K ₂ O v %	13,6
Bór (B) v %	0,04
Kobalt (Co) chelátovaný EDTA v %	0,09
Měď (Cu) chelátovaný EDTA v %	0,09
Mangan (Mn) chelátovaný EDTA v %	0,09
Molybden (Mo) v %	0,011
Zinek (Zn) chelátovaný EDTA v %	0,09
Fulvokyseliny v %	62
Organické látky v % sušiny	62

Obsah rizikových prvků: splňuje zákonem stanovené limity v ČR.

Rozsah a způsob použití:

Před použitím si pečlivě přečtěte etiketu.

Pro profesionální uživatele.

Výrobek je určen k listové aplikaci.

Kompatibilita

Kinsidro Grow+ je rozpustný ve vodě a jeho použití je kompatibilní s většinou hnojiv a přípravků na ochranu rostlin. Před smícháním složek v postřikové nádrži by však měl být proveden test kompatibility s použitím relativních poměrů složek směsi v nádrži. Vždy se řiďte pokyny pro míchání v nádrži uvedenými na etiketě přípravku.

Další informace o kompatibilitě získáte od zástupce společnosti.

Při přípravě postřikové jichy pomalu přidávejte Kinsidro Grow+ do částečně naplněné míchací nádoby za stálého míchání. Do směsi přidejte zbytek vody a její další složky podle pokynů výrobce a pokračujte v míchání. Během aplikace nechte míchadlo zapnuté. U neznámých směsí vždy proveďte zkoušku kompatibility.

Bezpečnostní opatření pro použití

Nepoužívejte, pokud se do 3 hodin očekávají srážky.

Dávkování

Aplikujte 150 g/ha přípravku Kinsidro Grow+ ve 150 až 300 l vody/ha.

Aplikace

Přípravek Kinsidro Grow+ se aplikuje jednou za vegetaci. V travních porostech lze míchat i s ostatními kapalnými hnojivy.

Plodina	Načasování aplikace	Dávka g/ha	Objem vody (L/ha)
Kukuřice	BBCH 12-16	150 g/ha	150 až 300 l/ha
Ozimé obilniny	BBCH 12-13 list na podzim Od BBCH 25 - na jaře		
Jarní obilniny	Od BBCH 25 - na jaře		
Slunečnice	BBCH 12-14		
řepka olejka	Od BBCH 12-14		
Cukrová řepa	Od BBCH 12-14		
Sója	Od BBCH 14-16		
Pastviny	3-4 týdny před první sečí		
Rýže	BBCH 25-30		

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

Identifikace nebezpečí

Výrobek není klasifikován podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP).

EUH208 - Obsahuje ethylendiamintetraacetát kobaltnatý.

Může vyvolat alergickou reakci

EUH210 - Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání

Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Neskladujte v blízkosti potravin. Obaly nepoužívejte opakovaně. Po manipulaci si důkladně umyjte ruce. Při používání tohoto výrobku nejzte, nepijte a nekuřte. Nevdechujte prach. Nevdechujte mlhu z rozprašovače. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Obsah a obal likvidujte v souladu s místními předpisy. Vždy používejte osobní ochranné prostředky (OOP) včetně ochranných rukavic/ochranného oděvu/ochrany očí/ochrany obličeje. Další informace naleznete v bezpečnostním listu.

Podmínky skladování:

Skladujte v původním obalu mimo dosah přímého slunečního záření, chraňte před mrazem.

Číslo šarže: uvedeno na obalu

Datum výroby: uvedeno na obalu

Použijte před: uvedeno na obalu

Doba použitelnosti: 4 roky od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Čistá hmotnost: 1 kg

Kinsidro je ochranná známka společnosti Corteva Agriscience a jejích přidružených společností.
Výrobek registrovaný v Rakousku podle @9 DMG 2021.

Výrobek je uváděn na trh v souladu s nařízením o vzájemném uznávání.