

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

LUNA[®] EXPERIENCE

Postrekový fungicídny prípravok vo forme tekutého dispergovateľného koncentráту určený na ochranu viniča, jadrovín a kôstkovín proti hubovým chorobám.

ÚČINNÁ LÁTKA:

Fluopyram	200 g/l (17,7% hm)
Tebuconazole	200 g/l (17,7% hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

CAS: 107534-96-3	1-(4-chlórfenyl)-4,4-dimetyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmetyl)pentán-3-ol
CAS: 658066-35-4	Fluopyram
CAS: 68515-73-1	Alkyl polysaccharide
CAS: 9043-30-5	Isotridecanol, ethoxylated

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS07



GHS08

Pozor

H319	Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H351	Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
H360FD	Môže poškodiť plodnosť. Môže poškodiť nenarodené dieťa.
H412	Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH 208	Obsahuje 1,2-benzisothazole-3(2H)-one. Môže vyvolať alergickú reakciu.
EUH 401	Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.
P273	Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280	Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P308 + P313	Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhládajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P391	Zobierajte uniknutý produkt.
P501	Zneškodnite obsah/nádobu na skládku nebezpečného odpadu alebo odovzdajte na likvidáciu subjektu, ktorý má oprávnenie na zber, recykláciu a zneškodňovanie prázdnych obalov v súlade s platnou národnou legislatívou.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

- Z4** Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné.
- Vt5** Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.
- Vo3** Pre ryby a ostatné vodné organizmy slabo jedovatý
- V3** Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.
- Vč3** Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie.
Prípravok je pre populácie *Typhlodromus pyri*, *Aphidius rhopalosiphi*, *Coccinella septempunctata* a *Chrysoperla carnea* s prijateľným rizikom.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

PHO¹ Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných vôd i povrchových vôd; pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. ochranné pásmo.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu!

Zákaz vylievania nespotrebovaných zvyškov prípravku a postrekovej kvapaliny do verejnej kanalizácie!

Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Držiteľ autorizácie:

BAYER spol. s r.o., Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, Slovenská republika

Číslo autorizácie ÚKSÚP: **14-02-1462**

Dátum výroby: uvedené na obale
Číslo výrobnéj šarže: uvedené na obale
Balenie: 0,25 l, 0,5 l, 1 l a 3 l HDPE fľaša
 5 l a 10 l HDPE kanister

Luna[®] je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bayer AG

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Luna Experience obsahuje dve účinné látky fluopyram a tebuconazole s odlišným mechanizmom účinku.

Fluopyram je nová účinná látka, ktorá pôsobí systémovo. Patrí do chemickej skupiny benzamidov a účinkuje ako SDH inhibítor.

Tebuconazole je širokospektrálny systémovo pôsobiaca fungicídna účinná látka. Spôsobom účinku je zaradená medzi inhibítormi demetylácie ergosterolov (DMI). Inhibuje klíčenie spór a blokuje rast mycélia hubových patogénov.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina	Účel použitia	Dávka/ha	Ochranná doba	Poznámka

vinič	múčnatka viniča, biela hniloba viniča	0,375 l	14 dní	BBCH 57 – 79
jadroviny	múčnatka jabloňová, chrastavitosť jabloní, chrastavitosť hrušiek, nektriová rakovina, skládkové choroby: moníliová hniloba, pleseň sivá, horká hniloba, modrá hniloba, alternáριοvá hniloba, chrastavitosť	0,25 l/meter výšky olistenej koruny/ha	14 dní	BBCH 57 – 87 max 0,75 l/ha
čerešňa, višňa, slivka	moníliová spála kôstkovín, moníliová hniloba plodov, škvrnitosť listov, koletotrichová hniloba	0,2 l/meter výšky olistenej koruny/ha	7 dní	BBCH 59 – 87 max 0,6 l/ha
marhuľa	moníliová spála kôstkovín, moníliová hniloba plodov	0,25 l/meter výšky olistenej koruny/ha	7 dní	BBCH 59 – 87 max 0,5 l/ha
broskyňa, nektarinka	moníliová hniloba plodov	0,25 l/meter výšky olistenej koruny/ha	7 dní	BBCH 81 – 87 max 0,5 l/ha

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Vinič: Prípravok je určený na ochranu viniča proti múčnatke viniča a bielej hnilobe viniča. Aplikuje sa zásadne preventívne, optimálne s použitím prognózy a signalizácie výskytu chorôb.

Odporúčené dávkovanie:

- V období od BBCH 57 do BBCH 79
- Max. počet aplikácií za vegetáciu: 2×
- Interval medzi aplikáciami: 10-12 dní v závislosti od infekčného tlaku chorôb. Pri silnom infekčnom tlaku chorôb nie je vhodné prekročiť interval 10 dní medzi aplikáciami.
- Dávka vody: 200-1000 l/ha

Jadroviny: Prípravok je určený na ochranu proti múčnatke jabloňovej a chrastavitosti jadrovín, nektriovej rakovine, skládkovým chorobám: moníliovej hnilobe, plesni sivej, horkej hnilobe, modrej hnilobe, alternáριοvej hnilobe a chrastavitosti jadrovín.

Aplikuje sa zásadne preventívne, optimálne s využitím prognózy a signalizácie výskytu chorôb.

Odporúčené dávkovanie:

- Používajte v období od BBCH 57 do BBCH 87
- Dodržte interval medzi ošetreniami prípravkom Luna Experience najmenej 21 dní. Interval medzi fungicídnymi ošetreniami pri striedaní prípravkov v závislosti od infekčného tlaku je 10-14 dní, pri silnom infekčnom tlaku chorôb nie je vhodné prekročiť interval 10 dní medzi aplikáciami.
- Dávka vody: max. 1500 l/ha (500 l/1m výšky olistenej koruny).
- Pri maximálnej výške olistenej koruny jadrovín 3 m (dávka 0,75 l/ha) použite len 1x za vegetačnú sezónu. Pri maximálnej výške olistenej koruny do 2 m (dávka do 0,5 l/ha) použite najviac 2x za vegetačnú sezónu.

Čerešňa, višňa, slivka: Prípravok je určený na ochranu proti moníliovej spále kôstkovín, moníliovým hnilobám plodov kôstkovín, škvrnitosti listov kôstkovín a koletotrichovej hnilobe. Aplikuje sa zásadne preventívne, optimálne s využitím prognózy a signalizácie výskytu chorôb.

Odporučené dávkovanie:

- Používajte v období od BBCH 59 do BBCH 87
- Dodržte interval medzi ošetreniami prípravkom Luna Experience najmenej 21 dní. Interval medzi fungicídnymi ošetreniami pri striedaní prípravkov v závislosti od infekčného tlaku chorôb je 7 dní.
- Dávka vody: max. 1500 l/ha (500 l/1m výšky koruny).
- Pri maximálnej výške olistenej koruny 3 m (dávka 0,6 l/ha) použite len 1x za vegetačnú sezónu. Pri maximálnej výške olistenej koruny do 2 m (dávka do 0,4 l/ha) použite najviac 2x za vegetačnú sezónu.

Broskyňa, nektarinka, marhuľa: Prípravok je určený na ochranu proti moníliovým hnilobám plodov kôstkovín. Aplikuje sa zásadne preventívne, optimálne s využitím prognózy a signalizácie výskytu chorôb.

Odporučené dávkovanie:

- Používajte v období od BBCH 81 do BBCH 87
- Dodržte interval medzi ošetreniami prípravkom Luna Experience 21 dní. Interval medzi fungicídnymi ošetreniami pri striedaní prípravkov v závislosti od infekčného tlaku chorôb je 7 dní.
- Dávka vody: max. 1000 l/ha (500 l/1m výšky koruny).
- Pri maximálnej výške olistenej koruny: 2 m (dávka do 0,5 l/ha) použite najviac 2x za vegetačnú sezónu.

Neaplikujte letecky, len pozemne. Aplikácia prípravku sa vykonáva schválenými pozemnými postrekovačmi a rosičmi, ktoré zabezpečujú presné a rovnomerné dávkovanie podľa návodu na použitie.

Aplikujte na suché rastliny. Aplikácie v období veľkých poludňajších horúčav nie sú vhodné.

Menej významné použitie

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina	Účel použitia	Dávka/ha	Ochranná doba	Poznámka
kel ružičkový, kapusta hlávková, karfiol	alternáriová škvrnitosť krúžkovitá škvrnitosť listov	0,75 l	14 dní	
mrkva	Alternáriová škvrnitosť mrkvy, Múčnatka mrkvová	0,6 l	14 dní	
petržlen	Múčnatka mrkvová	0,6 l	14 dní	

cibuľa	alternatívová škvrnitosť cibule, plesen sivá, hrdza cibul'ová	0,5 l	7 dní	
pór	alternatívová škvrnitosť póru, hrdza cibul'ová	0,75 l	21 dní	

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 200-800 l/ha

Kel ružičkový, kapusta hlávková, karfiol:

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 1x.

Prípravok aplikujte od začiatku tvorby bočných výhonov (BBCH 20) do konca dospievania vegetatívnych častí rastlín (BBCH 49).

Mrkva, petržlen:

Počet aplikácií za vegetačné obdobie: 1 - 2 x.

Interval medzi aplikáciami: 21 dní.

Prípravok aplikujte od rastovej fázy, kedy je vývoj hlavnej stonky ukončený (BBCH 20) do rastovej fázy, kedy je hrubnutie koreňa ukončené (BBCH 49).

Cibuľa:

Počet aplikácií za vegetačné obdobie: 1 - 2x

V maximálnej aplikáčnej dávke prípravku za sezónu 2 x 0,5 l/ha - aplikácia 1x za 2 roky na tom istom pozemku.

Prípravok aplikujte od rastovej fázy, kedy je vývoj hlavnej stonky ukončený (BBCH 20), do rastovej fázy, kedy sú listy cibule mŕtve a vrchol cibule suchý (BBCH 49).

Pór:

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 1x za 2 roky na tom istom pozemku.

Prípravok aplikujte od rastovej fázy, kedy je vývoj hlavnej stonky ukončený (BBCH 20) do rastovej fázy konečného vzrastu (BBCH 49).

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMÝCH A NEPRIAMÝCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Prípravok Luna Experience nemá negatívny vplyv na úrodu viniča ani na kvalitu zozberaného hrozna a na proces spracovania hrozna formou kvasenia.

Prípravok Luna Experience je selektívny k plodine a to tak, že plodina je tolerantná k prípravku.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka fluopyram je zaradená podľa FRAC do skupiny C2 – SDHI fungicidy, (FRAC kód 7), so stredným až vysokým rizikom vzniku rezistencie.

Účinná látka tebuconazole patrí podľa FRAC do skupiny G1 - DMI fungicidy (SBI: Class I), ktoré sú z hľadiska vzniku rezistencie hodnotené ako stredne rizikové.

- Na zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte prípravok Luna Experience alebo iný, ktorý obsahuje účinné látky zo skupín SBI a SDHI viac ako 3x počas vegetácie vo viniči a maximálne 2x počas vegetácie v jadrovinách a v kôstkovinách.

- Uprednostňujte preventívne použitie prípravku, v odôvodnených prípadoch možno použiť i kuratívne a eradikatívne.
- Používajte registrované dávky prípravku; používanie redukovaných (subletálnych) dávok môže viesť k rýchlej selekcii populácií s priemernými hladinami tolerancie. Vysoké dávky naopak predstavujú zbytočne vysoký selekčný tlak.

VPLYV NA ÚRODU

Pri dodržaní aplikačnej dávky a návodu na použitie nemá prípravok negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Aplikáciu vykonávajte tak, aby nedošlo k priamemu zasiahnutiu ani k úletu aplikačnej tekutiny na okolité porasty. Aplikačnou tekutinou nesmú byť zasiahnuté necieľové porasty v okolí ošetrovanej plochy. Postrek vykonávajte len za bezvetria alebo mierneho vánku, a to v smere vetra od pracujúcich.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok Luna Experience je použiteľný v pestovateľských systémoch využívajúcich introdukciiu dravého roztoča Typhlodromus pyri pri zohľadnení a dodržaní konkrétnych pravidiel jednotlivých systémov. Prípravok nie je škodlivý pre včely.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Pri príprave zmesi je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlievajte do nádrže oddelene. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

- úplne vyprázdňte aplikačné zariadenie na ošetrovanom pozemku
- vyberte všetky filtre a trysky a prepláchnite ich čistou vodou
- naplňte aplikačné zariadenie do 1/4 alebo do ponorenia agitátora vodou (v prípade použitia tank mixu s prípravkami na báze oleja je možné pridať 0,5% detergent)
- premiešajte najmenej jednu minútu a prepláchnite cez pumpu, pokiaľ má aplikačné zariadenie systém čistenia, použite ho
- výplachovú vodu zachyťte
- vykonajte prepláchnutie ešte jeden krát
- opláchnite aplikačné zariadenie z vonkajšej strany
- výplachovú vodu naplňte do aplikačného zariadenia a vystriekajte na ošetrovanom pozemku alebo iným spôsobom bezpečne zlikvidujte

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný odev, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení postreku použite navyše zásteru z pogumovaného textilu. Poškodené ochranné pracovné prostriedky je potrebné urýchlene vymeniť. Pracovníci vstupujúci do ošetrovaných porastov musia mať gumené rukavice, primerané pracovné oblečenie (košeľ a s dlhým rukávom, dlhé nohavice) a vhodnú pracovnú obuv.

Počas práce a po nej, až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť!

Postrek sa smie vykonávať len za bezvetria alebo mierneho vánku, v tom prípade v smere po vetre a od pracujúcich. Susediace plodiny ani iné kultúry nesmú byť zasiahnuté postrekovou kvapalinou. Opätovný vstup na pozemok je možný až po zaschnutí prípravku.

Prípravok nie je horľavinou. Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných, ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku toxických splođín.

PRVÁ POMOC:

Po nadýchaní: Preneste na čerstvý vzduch. Postihnutého ponechajte v teple a pokoji. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc alebo stredisko pre pomoc postihnutým otravou.

Po požití: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc alebo stredisko pre pomoc postihnutým otravou.

Po zasiahnutí očí: Okamžite vyplachujte veľkým množstvom vody aj pod viečkami po dobu najmenej 15 minút. Pokiaľ sú nasadené kontaktné šošovky, vyberte ich po prvých 5 minútach a potom pokračujte vo vyplachovaní očí. Ak sa vyvinie a pretrváva podráždenie, zaistite lekárske ošetrovanie.

Po zasiahnutí pokožky: odstráňte znečistený odev, zasiahnuté miesta umyte mydlom a teplou vodou.

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.č.: 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od +5 do +30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov prípravkov na ochranu rastlín. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu jeho výroby. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom!

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužitý zvyšok prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužitý zvyšok postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.