



Silicare

KATEGORIE FUNKCE PRODUKTU

VÍCESLOŽKOVÉ KAPALNÉ ANORGANICKÉ HNOJIVO S MAKROŽIVINAMI KfV 1 (C)(I)(b)(ii) v roztoku

DEKLAROVANÝ OBSAH ŽIVIN PODLE HMOTNOSTI

CELKOVÝ OXID FOSFOREČNÝ (P₂O₅)	10,0% - 145 g/l
Oxid fosforečný (P ₂ O ₅), rozpustný ve vodě	10,0% - 145 g/l
Oxid fosforečný (P ₂ O ₅), rozpustný v neutrálním citrátu amonném	10,0% - 145 g/l
CELKOVÝ OXID DRASELNÝ (K₂O)	20,0% - 290 g/l
Oxid draselný (K ₂ O), rozpustný ve vodě	20,0% - 290 g/l

VLASTNOSTI

Jedná se o tekuté hnojivo s obsahem draslíku (K), fosforu (P) a křemíku (Si), které optimalizuje minerální výživu rostliny a podporuje přirozenou obranyschopnost. Hnojivo je určeno k aplikaci na list. Živiny, které jsou v hnojivu obsaženy, spolu s aminokyselinou L-prolin komplexním způsobem zvyšují životaschopnost rostlin. V důsledku účinků křemíku mají rostlinné tkáně mechanickou pevnost. Aktivnější fotosyntéza urychluje přenos dalších živin ze zelených tkání do semen.

SLOŽENÍ

Křemičitan draselný, č. CAS: 7758-11-4 (CMC1), Difosforečnan draselný, č. CAS: 1312-76-1 (CMC1)

NÁVOD K POUŽITÍ

PLODINY	DÁVKOVÁNÍ	ZPŮSOB A DOBA APLIKACE
Obilniny	0,5–1,0 l/ha	Aplikace na list – vhodné zejména v druhé polovině vegetace až do poloviny dozrávání.
Olejniny		
Luštěniny		
Řepa		
Kukuřice		
Brambory	0,25–0,5 l/100 l vody	
Zelenina	0,25–0,5 l/100 l vody / zalévání 0,2–0,5% roztokem	Aplikace na list / zalévání v době tvorby a dozrávání plodů, 3–5krát, každých 7–10 dní.
Ovocné výsadby		Aplikace na list / zalévání v době tvorby a dozrávání plodů, 4–6krát, každých 5–7 dní
Réva vinná		Aplikace na list / zalévání v době tvorby a dozrávání bobulí, 2-3 krát
Okrasné rostliny		Aplikace na list / zalévání na podzim, aby rostliny lépe přečkaly zimu, a během rozkvetu každých 7–10 dní.

Používejte pouze v případech, kdy je to zapotřebí. Nepřekračujte aplikační dávku. Pouze pro profesionální použití. Před použitím protřepte. Nedoporučuje se používat při teplotách vyšších než 25 °C nebo nižších než 10 °C.

Pro další konkrétní doporučení kontaktujte společnost Ikar Agro Solutions s.r.o.

KOMPATIBILITA

Silicare lze používat v kombinaci s mnoha hnojivy a pesticidy (insekticidy, fungicidy). Nepoužívejte v kombinaci s produkty s vysokým obsahem mědi (Cu), síry (S) a minerálních olejů. Před namícháním se doporučuje smíchat malé množství směsi a zkontrolovat, zda v něm nejsou usazeniny. Doporučuje se nejdříve postříkat malou oblast, abyste zjistili, zda to nemá na rostliny fytotoxické účinky.

DOPORUČENÉ PODMÍNKY PRO SKLADOVÁNÍ

Uchovávejte mimo dosah přímého slunečního záření a možného mechanického poškození obalů.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte produkt při teplotách nepřesahujících +35 °C a ne nižších než +5 °C.

INFORMACE K BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Po dokončení práce s produktem si důkladně umyjte ruce mýdlem.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.
- Uchovávejte odděleně od jídla, pití a krmení pro zvířata.
- Zabraňte styku produktu s pokožkou nebo očima.
- Jestliže dojde ke styku produktu s pokožkou, okamžitě ji umyjte mýdlem a vodou.

VĚTY O NEBEZPEČNOSTI

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.



NEBEZPEČÍ

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ

P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P264 Po manipulaci si důkladně omyjte ruce.

P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.

P302 + 352 PŘI STYKU S KÚŽÍ: Omyjte mýdlem a vodou.

P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.

P321 Odborné ošetření (viz ... na tomto štítku).

P332 + 313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

DALŠÍ INFORMACE



Křemík (SiO₂)

8,0% - 115 g/l

Křemík rozpustný ve vodě (SiO₂)

6,0% - 85 g/l

Aminokyselina L-proline

0,3 % – 4,3 g/l

Výtažek z mořských řas

0,1% - 1,4 g/l

UFI: QRC7-298Q-UTKS-VWJM

DATUM VÝROBY vyznačeno na obalu.

TRVANLIVOST PRODUKTU při správném skladování je 3 roky od data výroby.

ČÍSLO ŠARŽE vyznačeno na obalu.

NETTO OBJEM 5 l ± 1 %

VÝROBCE

Ikarai, UAB

Vakarų str. 6, Kedainiai, Litva

www.ikarfactory.eu, info@ikarfactory.eu

DISTRIBUTOR

IKAR Agro Solutions s.r.o.

Pod Havránkou 7/6a

171 00 Praha 7 – Trója

www.ikaragro.cz