

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

SÍRA 800 WG

Kontaktný fungicídny prípravok vo forme vodorozpuštného granulátu proti múčnatke jablonovej v jabloniach a múčnatke viniča, erinóze, akarinoze vo viniči.

ÚČINNÁ LÁTKA:

Sulphur (síra) 800 g/kg (80 % hmot.)

Názov látok v prípravku ktoré sú klasifikované, alebo na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný do kategórií nebezpečenstva: Sulphur (síra) CAS No.: 7704-34-9

KLASIFIKÁCIA A OZNAČENIE:

nepožaduje sa

- P501 Zneškodnite obsah/nádobu vo zberniach nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.
EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.
- SP1** Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).
- Spe3** Z dôvodu ochrany necielených článkonožcov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a neobhospodarovanou zónou neošetrený pás zeme v dĺžke 5 m pri použití na ošetrovanie viniča a 15 m pri použití na ošetrovanie jabloní.
- Z4** Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.
- Vt5** Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre vtáky prijateľné.
- Vo4** Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre ryby a ostatné vodné živočíchy prijateľné.
- V3** Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.
- Vč3** Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie a návodu na použitie.
Prípravok je škodlivý pre populácie *Trichogramma cacoeciae*.

ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT!

ZÁKAZ POUŽÍVANIA PRÍPRAVKU V 1. OCHRANNOM PÁSME VODNÝCH ZDROJOV.

DBAJTE O TO, ABY SA ZVÝŠKY PRÍPRAVKU A JEHO OBALY V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTAL DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOľNEJ PRÍRODE! ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE.

Výrobca: BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Nemecko

Držiteľ povolenia: AGROFERT, a.s. organizačná zložka Agrochémia,
Nobelova 34, 836 05 Bratislava

Číslo povolenia ÚKSÚP: **14-PD-0548**

Dátum výroby: uvedený na obale
 Číslo výrobnej šarže: uvedený na obale
 Balenie: 25 kg PE vrece
 Doba použiteľnosti: 2 roky od dátumu výroby

PÔSOBNIE PRÍPRAVKU

SÍRA 800 WG je sírnatý, kontaktne pôsobiaci fungicíd určený na ochranu proti múčnatke jablonovej v jabloniach a múčnatke viniča, erinóze, akarinoze vo viniči.

Pôsobí predovšetkým preventívne, má rýchly nástup účinku s reziduálnym pôsobením a s dobrým akaricídnyim účinkom. Spôsob účinku spočíva v inhibícii dýchania, v prerušovaní tvorby proteínov a ako ťažký kov v chelátovej forme vo vnútri buniek húb spôsobuje spomalenie klíčenia spór a rast hýf.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina	Účel použitia	Dávka / ha (koncentrácia v %)	Ochranná doba	Poznámka
jablň	múčnatka jablňová	6 kg (0,6%)	3 dni	-
vinič	múčnatka viniča	6 kg (0,6%)	AT	
		4 kg (0,4%)	AT	
	erinóza, akarínóza	2%	AT	

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody 1000 l/ha

Jablň: ošetríte preventívne. Prvé ošetroenie vykonajte v štádiu myšieho uška, ďalšie ošetrenia až do začiatku kvitnutia a po odkvitnutí približne v 7 – 14 dňových intervaloch podľa infekčného tlaku choroby. Neaplikujte pri vyšších teplotách (nad 25 °C), niektoré odrody jabloní sú citlivé na ošetroenie sírnatými prípravkami. SÍRA 800 WG obmedzuje výskyt roztočcov.

Vinič: Prvé ošetroenie proti múčnatke viniča vykonajte v štádiu 20 cm dlhých výhonkov a ďalej podľa potreby a infekčného tlaku v 5 – 10 dňových intervaloch. Vyššiu dávku 6 kg (0,6 %) aplikujte pred kvitnutím, nižšiu dávku 4 kg (0,4 %) po kvitnutí viniča.

Proti erinóze a akarínóze aplikujte SÍRA 800 WG v štádiu tesne pred rašením viniča.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMÝCH A NEPRIAMÝCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pre minimalizáciu rizika poškodenia včiel aplikujte mimo letu včiel - skoro ráno, neskôr večer!

Niektoré odrody jabloní sú citlivé na ošetroenie sírnatými prípravkami. Pri aplikácii pri teplotách vyšších ako 25°C hrozí riziko fytotoxicity.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Síra patrí medzi fungicídy s viacpolohovou kontaktnou účinnosťou, ktoré všeobecne nevyvolávajú rezistenciu.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako

nebezpečný odpad. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Použité aplikačné zariadenie a ochranné pracovné prostriedky asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte pracovný ochranný odev, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumené rukavice a gumenú obuv. Postrek vykonávajte za bezvetria alebo mierného vánku v smere od pracujúcich s postupom do neošetrenej plochy. Postrek nesmie zasiahnuť susediace kultúry! Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Pred jedlom a po skončení práce si dôkladne umyte ruky mydlom a teplou vodou. Zvyšky postrekovej kvapaliny a splašky nevyliievajte v blízkosti zdrojov vôd a recipientov vôd. Vyvarujte sa predávkovaniu, spôsobeného prekryvaním postrekových pásov alebo zlou prípravou postrekovej kvapaliny. Prípadný požiar haste penou, práškom, pieskom alebo zeminou. Vodu je možné použiť iba výnimočne, hasenie nevykonávajte silným prúdom a dokonale zabezpečte, aby kontaminovaná voda, použitá na hasenie, neunikla z priestoru požiaru do okolia, predovšetkým do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných vôd a recipientov povrchových vôd a nezasiahla poľnohospodársku pôdu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pri protipožiarnej zásahu použite izolačné dýchacie prístroje lebo pri horení môžu uniknúť toxické plyny.

PRVÁ POMOC

Po nadýchaní zabezpečte pokoj a čerstvý vzduch, v prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc.

Po náhodnom požití okamžite si vypláchnite ústa, vypite veľké množstvo vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Ak je postihnutý v bezvedomí alebo má kŕče, nikdy nevyvolávajte zvracanie ani nepodávajte nič ústami.

Po zasiahnutí očí vymývajte prúdom čistej vody po dobu 10-15 minút, zabezpečte lekárske ošetrenie ak začervenanie očí pretrváva.

Po zasiahnutí pokožky odstráňte zasiahnutý odev a zasiahnuté miesto umyte mydlom a vodou. Ak sa objaví podráždenie, vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri podozrení na otravu alebo pri otrave privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s pracovníkmi Národného toxikologického informačného centra v Bratislave (tel. 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách 5-30° C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom.

Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVÝŠKOV

Nepoužívané zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Nepoužívané zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrovanom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

