

## SK sol

Výrobca: Lovochemie a.s., Terezińska 57, Lovosice

Nezodpovedá typu

číslo rozhodnutia o registrácii: 2789

### Chemické a fyzikálne vlastnosti:

Znak akosti	Hodnota
Draslík ako K <sub>2</sub> O v %	26,0
Síra ako S v %	17,0
pH zriedeného roztoku (1:5)	7,5–9,5
Hustota v kg/l pri 20 °C	cca 1,5

### Obsah rizikových látok:

Hnojivo spĺňa zákonom stanovené limity: (mg/kg hnojiva) kadmium 1; olovo 10; ortuť 1, arzén 20; chróm 50.

### Použitie:

Hnojivo sa používa pri nedostatku draslíka a síry v rastlinách. Vzhľadom na to, že hnojivo obsahuje vysoké koncentrácie draslíka a síry, je veľmi vhodné pre plodiny náročné na tieto živiny. Dôležité je to najmä pre repku, slnečnicu, ľan, mak a ďalej pre rastliny, pri ktorých je dôležitá vysoká hladina silíc, ako je horčica, chmeľ a pod. Síra v kombinácii s draslíkom je tiež dôležitá pre kŕmnu a cukrovú repu. Hnojivo má nenahraditeľnú úlohu v ovocinárstve a zeleninárstve v prípade plodín, ako sú cibuľa, cesnak, pór a celkovo všetky koreňové zeleniny, v ovocinárstve v prípade viniča, jabloní a pod. Vzhľadom na formu, v akej sa síra nachádza v hnojive, má hnojivo okrem výživnej funkcie aj významnú fungistatickú úlohu, keď sa po listovej aplikácii na povrchu listov uvoľňuje síra v koloidnej forme, ktorá potláča šírenie hubovitých chorôb.

### Aplikácia:

Dávkovanie pre zálievku:

Plodina	Dávkovanie v ml/na 10 l vody na 5 m <sup>2</sup>
Fazuľa, šalát, reďkovka, reďkev a cibuľa	75 ml pred siatím alebo výsadbou
Uhorky, paradajky a papriky	80 ml pred siatím alebo výsadbou, 2 x 35 ml počas vegetácie
Skoré zemiaky	150 ml pred výsadbou
Ruže	150 ml v marci
Bobuľoviny (stredná plodnosť)	150 ml v marci
Okrasné dreviny	75 ml v marci

Dávkovanie pre foliárnu aplikáciu:

Plodina	Koncentrácia v %	Dávkovanie v ml do 10 l vody
Olejniny, mak a ľan	0,4-0,8	40-80
Obilniny	0,4-0,6	40-60
Cukrová repa, kŕmna repa	0,4-0,8	40-80
Šalát, fazuľa a uhorky	0,2-0,3	20-30
Mrkva, cibuľa, paradajky a zemiaky	0,4-0,6	40-60
Jadroviny, kôstkoviny, vinič	0,3-0,6	30-60
Zeler a hlúboviny	0,6-1,0	60-100
Rýchlená zelenina, mladé rastliny (sadba)	0,1-0,3	10-30
Bobuľoviny	0,3-0,4	30-40
Jahody	0,4-0,6	40-60
Okrasné rastliny	0,1-0,4	10-40

Maximálna odporúčaná dávka hnojiva sa pohybuje v rozmedzí 3 až 5 litrov na hektár. Hnojivo sa aplikuje v intervale 14 dní.

Odmerané množstvo hnojiva sa naleje do aplikačnej nádrže, kde je už naplnená cca ¼ objemu vody, potom sa za stáleho miešania doplní na stanovený objem.

**Označenie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP]:**

**Výstražné symboly nebezpečnosti:**

Odpada.

**Signálne slovo:**

Odpada.

**Štandardné vety o nebezpečnosti:**

Odpada.

**Pokyny na bezpečné zaobchádzanie:**

Odpada.

**Preprava a skladovanie:**

Hnojivo sa dopravuje v PE prepravných nádobách alebo iných obalových jednotkách dohodnutých s odberateľom. Skladuje sa v polyetylénových, sklolaminátových zásobníkoch alebo v pôvodných obaloch. Teplota výrobku pri skladovaní nesmie klesnúť pod +5 °C. Pri balených výrobkoch sa obaly plnia s presnosťou +/- 3 %.

**Objem balenia:** 0,5, 1, 5, 20, 1000 litrov, cisterny

**Doba použiteľnosti:** 24 mesiacov pri skladovaní v pôvodných obaloch

**Dátum výroby:**