

Pomocný prípravok v ochrane rastlín pre profesionálnych používateľov

SPODNAM DC

Adjuvant vo forme emulgovateľného koncentrátu určený na zníženie predzberových a zberových strát v repke ozimnej, repke jarnej, hrachu a semenných porastoch karfiolu.

AKTÍVNA ZLOŽKA:

Pinolene 555,4 g/l (57,9 % hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

pinolene CAS No.: 34363-01-4

OZNAČENIE:



GHS07



GHS09

Pozor

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami.

EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P302+352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P333+313 Ak sa objaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v povolenej spaľovni odpadov.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. Nečistite aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd. Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek.

SPe3 Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 3 m.

Z 4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné.

Vt 5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo 1 Pre ryby a ostatné vodné organizmy mimoriadne jedovatý.

V 3 Riziko prípravku je prijateľné pre dažďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč 3 Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie.

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode! Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu!

Uložte mimo dosahu zvierat!

Pri používaní prípravku dodržiavajte podmienky správnej poľnohospodárskej praxe.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

| | |
|---------------------------------|---|
| Výrobca: | Taminco BVBA, Pantserschipstraat 207, 9000 Gent, Belgicko |
| Držiteľ autorizácie: | Taminco BVBA, Pantserschipstraat 207, 9000 Gent, Belgicko |
| Poverený zástupca: | FMC Agro Slovensko s r.o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava |
| Číslo autorizácie ÚKSÚP: | 15-20-1521 |
| Dátum výroby: | uvedené na obale |
| Číslo výrobnej šarže: | uvedené na obale |
| Balenie: | 5 l HDPE kanister 10 l HDPE kanister |

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

SPODNAM DC aplikovaný na rastliny, pôsobením vzduchu polymerizuje a vytvára polopriepustnú membránu, ktorá umožňuje vysychanie šesúľ, resp. strukov a ich dozrievanie, ale neprepustí vodu smerom do šesúľ, resp. strukov.

NÁVOD NA POUŽITIE

| Plodina | Účel použitia | Dávka/ha | Ochranná doba | Poznámka |
|---------------------------|--|----------|---------------|-------------------------------------|
| repka ozimná, repka jarná | obmedzenie predzberových a zberových strát | 1,25 l | AT | |
| hrach | obmedzenie predzberových a zberových strát | 1,25 l | 21 - 28 | na zrno |
| karfiol | obmedzenie predzberových a zberových strát | 1,25 l | AT | semenné porasty, pozemne aj letecky |

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Repka ozimná, repka jarná - prípravok aplikujte v dobe, keď 50 % šesúľ mení farbu z tmavozelenej na svetlozelenú, t.j. asi 3-4 týždne pred predpokladaným zberom. Najneskorší termín ošetrenia je vtedy, keď sú šesule žlté, ale sú ešte pružné. Množstvo postrekovej kvapaliny pri leteckej aplikácii je 55-70 l.ha⁻¹. Neošetrovať porasty zaburinené, napadnuté škodcami a hubovými chorobami!

Hrach - aplikujte v dobe, keď hrach začína dozrievať a semená obsahujú 40-50 % vody. Porast je zvyčajne žltý, struky sú svetlo zelené, ešte pružné, semená sú vyvinuté a tuhé.

Karfiol (semenné porasty) - aplikujte na začiatku žltnutia šesúľ. Aby pripravok dokonale pokryl povrch šesúľ, je možné uvedenú dávku pri leteckej aplikácii rozdeliť na polovicu (0,625 l prípravku SPODNAM DC v 20-60 l.ha⁻¹ vody) a aplikovať tak, aby sa v predchádzajúcom lete ošetrový pás z polovice prekryval pri ďalšom lete v protismere, takže porast bude ošetrový dvakrát pri zachovaní povolenej aplikačnej dávky. Pri pozemnej aplikácii je možné urobiť to isté (s polovičnou dávkou prípravku 0,625 l.ha⁻¹ a vody 200-250 l.ha⁻¹) v proti pásoch.

POZOR!!! Nejedná sa o desikáciu, ale o uľahčenie zberu silne zaburinených porastov.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

V priebehu používania prípravku SPODNAM DC neboli zaznamenané žiadne negatívne účinky na užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem.

Pri príprave zmesi je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlievajte do nádrže oddelene.

Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3-krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača.. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodnenie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri príprave postreku používajte gumovú zásteru z pogumovaného textilu.

Počas práce a po nej až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia celého tela teplou vodou a mydlom nejedzte, nepite a nefajčite!

Striekať možno len za bezvetria alebo pri miernom vánku, v tom prípade v smere od pracujúcich. Postrek nesmie zasiahnuť susedné porasty. Prípravok nie je horľavinou.

V prípade požiaru tento hasiacou penou alebo práškom, popr. pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemnej hmly, a to len vtedy, ak je zabezpečené, že kontaminovaná voda neunikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje podzemných a ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

Pri požiarom zásahu používajte izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môžu vznikáť jedovaté splodiny!

PRVÁ POMOC

Po požití

podajte postihnutému cca 0,5 l pitnej vody, príp. s niekoľkými tabletami medicínalného uhlia. Zvracanie nevyvolávajte! Ak je postihnutý v bezvedomí, nič nepodávajte ústami! Privolajte lekára!

Po nadýchaní

prerušte prácu, zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, pokoj a teplo.

Po zasiahnutí pokožky

odstráňte postriekaný odev, pokožku omyte teplou vodou a mydlom.

Po zasiahnutí očí

premývajte prúdom čistej vody po dobu 10 - 15 minút a vyhľadajte lekárske ošetrovanie.

Pri otrave, alebo pri podozrení na otravu privolajte lekára, ktorého informujte o prípravku, poskytnutej prvej pomoci a telefónnom čísle Národného toxikologického informačného centra v

Bratislave (02/54774166). Na tomto telefónnom čísle v prípade potreby môže lekár liečbu konzultovať.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie, osobné ochranné pracovné prostriedky a pomocné nástroje, či nádoby, asanujte 3%-ým roztokom uhličitanu sodného (sóda) a dobre omyte vodou. Prípravok, postrekovú kvapalinu a oplachové vody zneškodnite ako nebezpečný odpad - nesmú zasiahnuť zdroje podzemných vôd a recipienty povrchových vôd.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte pri teplotách od +5°C do +35°C v suchých uzamknutých skladoch, v pôvodných neporušených uzatvorených obaloch, oddelene od potravín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a prázdnych obalov od týchto látok.

Prípravok chráňte pred mrazom, priamym slnečným žiarením a sálaním tepelných zdrojov. Pri dodržaní podmienok skladovania v neporušených originálnych obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE OBALOV A ZVYŠKOV

Vyprázdnený obal vymyte vodou a likvidujte ako ostatný odpad.

Nepoužitý prípravok v pôvodnom obale a prázdne obaly z prípravku odovzdajte v mieste zberu domového odpadu špeciálne vytvoreného pre tento účel (v rámci triedenia odpadov) príslušnou samosprávou (informujte sa u orgánu miestnej správy)! Obaly od prípravku sa nesmú znovu používať na akékoľvek iné účely!

Upozornenie

Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté na základe neodborného, predpisom nezodpovedajúceho skladovania a použitia prípravku.

Prípravok používajte len v súlade s platným „Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod.“.